

**4. Mittellauf der Schwarzen Elster**

Name: <b>Mittellauf der Schwarzen Elster</b> <i>(Zusammenlegung der Gebiete „Mittellauf der schwarzen Elster“, DE 4446-301; „Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung“, DE 4345-303; „Alte Röder bei Prieschka“, DE 4546-302 und „Alte Elster und Riecke Teil I und II“, DE 4345-301)</i>  (das Gebiet besteht aus 7 Teilflächen)		
Landes-Nr.: 495	EU-Nr.: DE 4446-301	Größe: rund 3 155 ha
Landkreis: Elbe-Elster Gemeinden: Bad Liebenwerda, Elsterwerda, Falkenberg/Elster, Großthiemig, Herzberg (Elster), Hohenleipisch, Plessa, Röderland, Schraden, Uebigau-Wahrenbrück		
Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150),</li> <li>- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion (3260),</li> <li>- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) (6410),</li> <li>- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430)</li> <li>- Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) (6440),</li> <li>- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510),</li> <li>- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli – Stellario-Carpinetum) (9160),</li> <li>- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190).</li> </ul>		
Prioritäre Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*).</li> </ul>		
Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Großes Mausohr (Myotis myotis),</li> <li>- Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus),</li> <li>- Biber (Castor fiber),</li> <li>- Fischotter (Lutra lutra),</li> <li>- Kammmolch (Triturus cristatus),</li> <li>- Rotbauchunke (Bombina bombina),</li> <li>- Rapfen (Aspius aspius),</li> <li>- Bitterling (Rhodeus amarus),</li> <li>- Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis),</li> <li>- Hirschkäfer (Lucanus cervus),</li> <li>- Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia),</li> <li>- Schwarzblauer Bläuling, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris nausithous, syn. Maculinea nausithous),</li> <li>- Froschkraut (Luronium natans).</li> </ul>		
Prioritäre Arten gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 11 des Bundesnaturschutzgesetzes) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eremit, Juchtenkäfer* (Osmoderma eremita).</li> </ul>		